



โรคพิษสุนัขบ้า **RABIES**

อาการของสัตว์ที่ติด "พิษสุนัขบ้า"

ระยะเริ่มแรก

นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด
เก็บตัว หวาดระแวง ม่านตาขยาย



เกิดจาก **เรบีส์ไวรัส (Rabies virus)** มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย
ลิง หมู หนู กระต่าย กระจอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย กัดไม่เลือก เห่าหอน

ระยะอัมพาต

น้ำลายไหล คางห้อยตก ล้มลง ตาย



คาถา
5ย.

อย่าแหย่



ทำให้สุนัขโกรธ

อย่าเหยียบ



หาง ห้ว ตัว ฯลฯ
ให้สุนัขตกใจ

อย่าแหย่




สุนัขที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า

อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัขกำลัง
กินด้วยมือเปล่า

อย่ายุ่ง



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงทุกปี



เลี้ยงสัตว์ในรั้วบ้าน เมื่อออกนอกบ้าน ต้องใช้สายจูงหมา

ฝึกให้สัตว์เลี้ยงเชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมันหมา คุณกำเนิดสัตว์เลี้ยง

คำแนะนำเมื่อถูก กัด ข่วน เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง

ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน



กักสุนัข แมว เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน

พบแพทย์ หากฉีดวัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง

